

L'UTILISATION D'UNE
SERINGUE SOUILLEE
PRESENTE UN RISQUE
D'INFECTION ENCORE
PLUS ELEVE QU'UN
RAPPORT SEXUEL NON
PROTEGE.



Pour de plus amples
informations:

www.odccp.org
www.unaids.org



Abus de drogues
et
VIH/sida =
une combinaison
catastrophique



Qu'est-ce que le sida?

Le sida est une maladie incurable causée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Lorsque le VIH pénètre dans le corps, il commence à attaquer le système immunitaire qui protège l'organisme contre les maladies. Au fil des ans, à mesure que le VIH affaiblit le système immunitaire, des maladies d'abord bénignes, puis graves et, pour finir, potentiellement mortelles apparaissent, telles que la tuberculose et la pneumonie. Ce dernier stade de l'infection est appelé sida.



Le VIH se transmet-il uniquement aux homosexuels et aux toxicomanes par voie intraveineuse? Non. N'importe qui peut être infecté par le VIH. Toute personne qui a une relation sexuelle non protégée ou échange une seringue risque de contracter le VIH/sida.



Comment se transmet le VIH?

Le VIH se transmet à l'occasion d'une relation sexuelle non protégée (rapport sans préservatif), par transfusion de sang contaminé ou du fait de l'utilisation d'une seringue souillée (la plupart du temps pour la consommation de drogues par injection); il peut en outre être transmis par une mère séropositive à son enfant durant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement.

Contracte-t-on le VIH en consommant des drogues?

Le risque d'être infecté par le VIH est plus grand si on consomme des drogues. Il suffit d'y réfléchir: vu que les drogues agissent sur l'esprit et modifient le jugement, il est plus difficile de dire "non" et de penser à utiliser un préservatif.

À quoi reconnaît-on une personne séropositive?

Il est impossible de savoir qui est porteur du VIH. Une personne séropositive peut ou non avoir l'air malade. Les personnes infectées par le VIH peuvent se sentir en bonne santé encore longtemps et être porteuses du virus durant des mois ou des années avant de tomber malades. Pendant tout ce temps-là, elles peuvent sans le savoir en contaminer d'autres si elles ont des relations sexuelles non protégées ou échangent des seringues.



Que faire si l'on est porteur du VIH?

Il faut s'informer auprès de médecins et de professionnels de la santé des soins médicaux et autres formes d'aide que peut dispenser la collectivité. Même si les nouvelles thérapies coûteuses qui permettent de retarder l'apparition du sida ne sont pas toujours disponibles, il est possible de se procurer des médicaments pour traiter et atténuer les infections, et de bénéficier d'un soutien psychologique et d'une aide sociale.



Comment savoir si l'on est porteur du VIH?

On peut consulter un médecin et faire un test de dépistage du VIH. Ce test permet de savoir si l'on est séropositif.

Comment éviter de contracter le VIH?

Il faut se protéger en utilisant des préservatifs, ne pas échanger de seringues et garder le contrôle de sa vie, autrement dit s'abstenir de prendre des drogues.